




CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL®



KARTA PACENTA

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Jméno a příjmení _____

Adresa _____

Telefon/mobil _____

Věk _____

Pohlaví ☐ F ☐ M

2. KRITÉRIA VYLOUČENÍ Z OŠETŘENÍ CHEMOEXFOLIACÍ

- a) herpes simplex v oblasti ošetření
- b) nedávný (posledních 6 měsíců) chirurgický zákrok (blefaroplastika, lifting očních víček apod.)
- c) onemocnění se ztrátou imunity a jejich léčba
- d) radioterapie části kůže, která by měla být ošetřena chemoexfoliací, což by mohlo způsobit ztrátu schopnosti fyziologické regenerace kůže
- e) rodinná anamnéza vzniku keloidních a hypertrofických jizev
- f) rodinná anamnéza vzniku postinflamatorní hyperpigmentace
- g) těhotenství
- h) kojení
- i) alergie a/nebo známá hypersenzitivita či jiná známá nebo pravděpodobná nekompatibilita s jednou nebo více látkami přípravku
- j) jiné důvody

3. INDIKACE PRO POUŽITÍ

Chemoexfoliace způsobuje narušení kůže, jejímž důsledkem je regenerace epidermálních buněk, prevence, kontrola, léčení nebo zmírnění některých patologických stavů kůže. Přípravky ENERPEEL® Medical Devices by měly být aplikovány na kůži za účelem prevence, kontroly a léčení nebo zmírnění některých patologických stavů kůže, jako jsou například hypertrofické jizvy, hyperpigmentační léze, elastóza kůže, zánětlivé akné, komedogenní akné, jizvy po akné, následky aktinického poškození, jako jsou potenciálně prekancerózní keratotické léze.

3.1.1. Aktinické poškození kůže

- aktinická keratóza
- solární elastóza
- solární lentigo
- dermatoheliosis
- změny pigmentace

3.1.2. Hyperpigmentační léze

- melasma
- postinflamatorní hyperpigmentace

3.1.3. Akné a jiné indikace

- povrchové jizvy
- plantární bradavice
- radiační keratóza
- sebaceózní hyperplasie
- acne vulgaris
- papulárně - pustulární rozacea
- jizvy po akné

4. FITZPATRICKOVA STUPNICE KLASIFIKACE FOTOTYPŮ

Hodnocení fototypů podle Fitzpatricka

FOTOTYP	POPIS
I	Jedinci s velmi světlou kůží, s častým výskytem skvrn, blond nebo zrzavými vlasy, modrými nebo šedými očima. Po vystavení slunečním paprskům se objeví erythema na nechráněné části kůže. Opálení je velmi slabé, nebo k němu vůbec nedojde. Tyto typy vykazují extrémní reakci na sluneční záření s vysokým rizikem trvalého poškození kůže.
II	Jedinci se světlou kůží, tmavě blond nebo světle hnědými vlasy. Lehce se spálí. Kůže má po opálení světle hnědou (zlatavou) barvu.
III	Jedinci se světle hnědou kůží a hnědými vlasy. Spálí se jen po delším pobytu na slunci. Kůže po opálení ztmavne.
IV	Jedinci s kůží olivové barvy, tmavými očima a černými vlasy. Ke spálení po vystavení slunečnímu záření u nich dochází jen výjimečně. Rychle se opalují do tmavě až čokoládově hnědé barvy.
V	Jedinci s velmi tmavou kůží, tmavými očima a černými vlasy. Ke spálení dochází jen velmi vzácně.
VI	Jedinci s černou kůží, tmavými očima a černými vlasy.

*** Důležité upozornění:** Fototypy IV, V a VI Fitzpatrickovy stupnice vykazují vyšší míru rizika výskytu hyperpigmentace v oblastech ošetření. Fototypy I, II, III jsou více náchylné k výskytu erythematu a jizev.

FOTOTYP PACIENTA

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

KARTA PACENTA

5. KLASIFIKACE FOTO STÁRNUTÍ PODLE GLOGAUOVY STUPNICE

Hodnocení foto stárnutí podle Glogaua

STUPEŇ STÁRNUTÍ	VĚK	POPIS
NÍZKÝ	28 - 35 let	Charakterizovaný vznikem malých vrásek, bez keratózy.
STŘEDNÍ	35 - 50 let	Charakterizovaný vznikem malých vrásek, nezdravě vypadající pleť, vznik aktinické keratózy.
POKROČILÝ	50 - 65 let	Charakterizovaný vznikem hlubokých vrásek, vznik teleangiektázie, pigmentových lézí a aktinické keratózy.
VYSOKÝ	60 - 75 let	Charakterizovaný dynamickými a gravitačními vráskami, foto stárnutím a aktinickou keratózou

FOTOSTÁRNUTÍ

Nízké ☐

Střední ☐

Pokročilé ☐

Vysoké ☐

6. GENETICKO - RASOVÁ KLASIFIKACE A SOUVZTAŽNÉ KOŽNÍ REAKCE NA CHEMOEXFOLIACI

Různé kožní reakce podle různého rasového původu na chemoexfoliaci (chemický peeling) můžeme rozdělit do 6 kategorií, v jejichž rámci má barva kůže vztah k somatickým rysům. Tyto kategorie jsou založeny na geografickém rozmištní a popsány v následující tabulce:

KATEGORIZACE PODLE RAS	PŮVODNÍ HABITAT	CHARAKTERISTICKÉ RYSY KŮŽE	KOMPLIKACE, VEDLEJŠÍ ÚČINKY	RATING
(A) Nordici (Suetici, Hibernici, etc.)	Severní Evropa	Světlá a velmi světlá barva. Velmi jemný povrch kůže.	erythema +++ teleangiektázie, jizvení	velmi dobrý
(B) Europaei (Anglici, Itali, Germani, Francogena, etc.)	Střední a Jižní Evropa	Průměrná barva a hrubost kůže.	malý výskyt	výborný
(C) Mediterranei (Hispani, Graeci, etc.)	Severní Afrika a Malá Asie	Tmavší barva a hrubší povrch než u Europeanů.	hyperpigmentace+ až ++ erythema +	velmi dobrý
(D) Indo-Pakistani (Pakistani, Indi, Thai etc.)	Severní-Střední Afrika a jih Malé Asie	Tmavší barva a hrubší povrch než mediteránní se silnou mastnou kůží a vlasy.	hyperpigmentace +++ hypopigmentace +	možné použití chemických peelingů
(E) Africani (Americani nigri, Sudani, Nigeriani, etc.)	Střední a Jižní Afrika	Černá až tmavě černá barva. Povrch kůže je hrubý až velmi hrubý.	hypopigmentace + hyperpigmentace ++	možné použití chemických peelingů
(F) Asiatici (lapponenses, Coreani, etc.)	Východní Asie	Barva kůže světle až středně tmavá. Povrch kůže je hrubý až velmi hrubý.	hyperpigmentace +++ erythema +++ přechází do hyperpigmentace	dobrý

Upozornění: vztah mezi Fitzpatrickovou stupnicí a rasově-genetickou klasifikací může být přínosný pro předvídání reaktivity kůže na chemický peeling.

GENETICKO - RASOVÉ ZAŘAZENÍ PACIENTA

(A) ☐

(B) ☐

(C) ☐

(D) ☐


(E) ☐

(F) ☐

7. DEFINICE OBLASTÍ KŮŽE URČENÝCH K OŠETŘENÍ

Oblast kůže je ta část kůže, na níž je prováděna chemoexfoliace. Oblasti kůže byly klasifikovány následujícím způsobem:

OBLASTI KŮŽE	POPIS
A	čelo
B	PRAVÁ obličejově-zygomatická zóna (včetně periokulární oblasti, nasogeniálního sulcu a nasolabiální zóny)
C	LEVÁ obličejově-zygomatická zóna (včetně periokulární oblasti, nasogeniálního sulcu a nasolabiální zóny)
D	krk
E	dekolt
F	záda
G	jiné části těla



ČÁST/ČÁSTI KŮŽE URČENÁ/URČENÉ K OŠETŘENÍ

A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐

8. CYKLUS PŘEDPOKLÁDANÝCH OŠETŘENÍ DLE INDIKACE

Počet individuálních ošetření _____ Datum provedení 1. ošetření _____
 Časový odstup mezi jedním a následujícím ošetřením _____ Datum provedení 2. ošetření _____
 Předpokládaná doba kompletního cyklu ošetření _____ Datum provedení 3. ošetření _____
 Datum provedení 4. ošetření _____

9. POUŽITÝ PŘÍPRAVEK A DOBA APLIKACE

Časová sekvence aplikace přípravku na různá místa kůže určená k ošetření

OŠETŘOVANÁ OBLAST	DOBA APLIKACE A MNOŽSTVÍ POUŽITÉHO PŘÍPRAVKU PŘED NEUTRALIZACÍ A/NEBO PŘED ODSTRANĚNÍM VYSRÁŽENÝCH KRYSTALŮ PŘÍPRAVKU							
	OŠETŘENÍ							
	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
A	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
B	1° trattamento		2° trattamento		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
C	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
D	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
E	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
F	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže
G	1° ošetření		2° ošetření		3° ošetření		4° ošetření	
	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev	min.	počet vrstev
	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže	přípravek	šarže

[illegible]