




CHEMOEXFOLIATION ENERPEEL®



ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Όνομα και επώνυμο _____

Διεύθυνση _____

Τηλέφωνο/Κινητό _____

Ηλικία _____ Φύλο ☐ Α ☐ Θ

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗΣ

- Παρουσία ιού Herpes simplex στην περιοχή που θα γίνει η θεραπεία.
- Πρόσφατη (μέσα στο διάστημα των τελευταίων 6 μηνών) χειρουργική επέμβαση (βλεφαροπλαστική, lifting βλεφάρων, κλπ.).
- Ανοσοκατασταλτικές ασθένειες και θεραπείες σε εξέλιξη.
- Προηγούμενη ακτινοθεραπεία του τμήματος της επιδερμίδας που πρόκειται να υποστεί απολέπιση και που θα μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία της φυσιολογικής αποκατάστασης του δέρματος.
- Οικογενειακό ιστορικό ανάπτυξης χηλοειδών και/ή υπερτροφικών ουλών.
- Οικογενειακό ιστορικό ανάπτυξης μεταφλεγμονώδους υπερμελάγχρωσης.
- Κύηση.
- Γαλουχία.
- Αλλεργία και / ή γνωστή υπερευαισθησία σε ένα ή περισσότερα από τα συστατικά.
- Άλλη αιτία κατά την κρίση του ιατρού.

3. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χημική απολέπιση, δηλαδή η αφαίρεση, που ακολουθείται από την αναγέννηση των επιδερμικών κυττάρων, ασκεί εξειδικευμένη δράση, για την πρόληψη, τον έλεγχο, τη θεραπεία ή τη μείωση κάποιων παθολογικών καταστάσεων του δέρματος. Τα Ιατροτεχνολογικά Βοηθήματα ENERPEEL® πρέπει να εφαρμόζονται στο δέρμα με σκοπό την πρόληψη, τον έλεγχο, τη θεραπεία ή τη μείωση διαφόρων δερματικών προβλημάτων, όπως για παράδειγμα υπερτροφικές ουλές, μελαγχρωματικές κηλίδες, ελάστωση, ακμή, φαγεσворγόνο ακμή, ουλώδης ακμή και ακτινικές βλάβες όπως υπερκεράτωση που μπορεί να είναι προκαρκινικής μορφής.

3.1.1. Βλάβες του δέρματος ακτινικής φύσης

- Ακτινική υπερκεράτωση
- Ηλιακή ελάστωση
- Ηλιακές υπερκερατώσεις

- Αλλοιώσεις στη χρώση του δέρματος
- Ρυτίδες από ελάστωση

3.1.2. Μελαγχρωματικές βλάβες

- Μέλασμα
- Υπερμελάγχρωση μετά από φλεγμονή

3.1.3. Ακμή και άλλες ενδείξεις

- επιφανειακές ουλές
- υπερκεράτωση από την ηλιακή ακτινοβολία
- κοινή ακμή
- ουλώδης ακμή
- σμηγματορροϊκή υπερκεράτωση
- ομαλές μυρμηκιές
- βλατιδο-φλυκταινώδης Ροδόχρους Νόσος

4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ FITZPATRICK

Κατηγοριοποίηση των φωτοτύπων κατά Fitzpatrick

ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτότυπος I	Άτομα με πολύ ανοικτό δέρμα, συχνά με φακίδες μαλλιά ξανθά ή κόκκινα, μάτια ανοικτά. Γενικά εμφανίζουν ερύθημα σε κάθε έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία. Το μαύρισμα είναι πολύ ελαφρό ή ανύπαρκτο. Η αντίδραση στην ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ έντονη, με υψηλό κίνδυνο μόνιμων βλαβών.
Φωτότυπος II	Άτομα με ανοικτό δέρμα, μαλλιά ξανθά σκούρα ή ανοικτά καστανά. Τείνουν να καίγονται εύκολα. Μαυρίζουν πολύ ελαφρά (χρυσό χρώμα).
Φωτότυπος III	Άτομα με αρκετά σκούρο δέρμα, μαλλιά καστανά. Καίγονται μόνο μετά από παρατεταμένη έκθεση. Μαυρίζουν έντονα και ομοιόμορφα.
Φωτότυπος IV	Άτομα με σταράτο δέρμα, μάτια και μαλλιά μαύρα. Καίγονται σπάνια. Μαυρίζουν σύντομα και έντονα παίρνοντας σοκολατένιο χρώμα.
Φωτότυπος V	Άτομα με πολύ σκούρο δέρμα, μάτια και μαλλιά μαύρα. Καίγονται πολύ σπάνια.
Φωτότυπος VI	Άτομα μαύρου δέρματος, μάτια και μαλλιά μαύρα.

* **Σημαντική προειδοποίηση:** Οι Φωτότυποι IV, V και VI της κλίμακας Fitzpatrick διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν υπερμελάγχρωση στις υπό θεραπεία περιοχές. Οι Φωτότυποι I, II, III είναι περισσότερο ευαίσθητοι να εμφανίσουν ερύθημα και ουλές.

ΦΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ GLOGAU

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με την κλίμακα GLOGAU

ΚΛΙΜΑΚΑ	ΗΛΙΚΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ελαφριά	Από 28 έως 35 ετών	Χαρακτηρίζεται από μικρές ρυτίδες και απουσία υπερκερατώσεων
Μέτρια	Από 35 έως 50 ετών	Χαρακτηρίζεται από μικρές ρυτίδες, κιτρινωπό χρώμα και παρουσία ακτινικών υπερκερατώσεων
Προχωρημένη	Από 50 έως 65 ετών	Χαρακτηρίζεται από βαθιές ρυτίδες παρουσία τηλεαγγειεκτασίας, βλάβες χρώσης και ακτινική υπερκεράτωση
Σοβαρή	Από 60 έως 75 ετών	Χαρακτηρίζεται από βαθιές και δυναμικές ρυτίδες, φωτογήρανση και ακτινική υπερκεράτωση

ΦΩΤΟΓΗΡΑΝΣΗ

ΕΛΑΦΡΙΑ ☐ ΜΕΤΡΙΑ ☐ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ☐ ΣΙΛΗΘ ☐

6. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΛΕΠΙΣΗ

Οι αντιδράσεις του δέρματος κάθε φυλής στη χημική απολέπιση (χημικό peeling) μπορούν να υποδιαιρούνται σε 6 κατηγορίες. Για κάθε κατηγορία το χρώμα του δέρματος συνδέεται με σωματικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι κατηγορίες βασίζονται στη γεωγραφική κατανομή που περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΛΗΣ	ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ	ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ-ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
(Α) Βόρειοι (Σουηδοί, Ιρλανδοί, κλπ)	Βόρεια Ευρώπη	Ανοικτό-πολύ ανοικτό χρώμα δέρματος. Επιδερμίδα και χαρακτηριστικά φυσιολογικής πολύ λεπτή.	Ερύθημα +++ Τηλεαγγειεκτασίες Ουλές	Πολύ καλή
(Β) Ευρωπαίοι (Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Γερμανοί, κλπ)	Κεντρική Ευρώπη Νότια Ευρώπη	Μέτριο χρώμα δέρματος και χαρακτηριστικά φυσιολογικής χοντροκομμένα.	Χαμηλή συχνότητα	Εξαιρετή
(Γ) Μεσογειακοί (Ισπανοί, Έλληνες, κλπ)	Νότια Ευρώπη –Βόρεια Αφρική- Δυτική Ασία	Πιο σκούρα επιδερμίδα και χαρακτηριστικά φυσιολογικής πιο χονδροκομμένα σε σχέση με τους Ευρωπαίους.	Υπερμελαγχρώσεις από + έως ++ Ερύθημα +	Πολύ καλή
(Δ) Ινδο- Πακιστανοί (Πακιστανοί, Ταϊλανδοί, κλπ)	Κεντρική-Βόρεια Αφρική, Νοτιοδυτική Ασία	Επιδερμίδα παχιά και λαδερή, πιο σκούρα και χοντροκομμένη σε σχέση με τους Μεσογειακούς.	Υπερμελαγχρώσεις +++ Υπομελαγχρώσεις +	Αποδεκτή
(Ε) Αφρικανοί (Σουδάν, Νιγηρία, κλπ)	Κεντρική-Νότια Αφρική	Μαύρο έως πολύ μαύρο χρώμα επιδερμίδας. Χαρακτηριστικά χονδροειδή έως πολύ χονδροειδή.	Υπομελαγχρώσεις + Υπερμελαγχρώσεις ++	Αποδεκτή
(Ζ) Ασιάτες (Ιάπωνες, Κορεάτες, κλπ)	Ανατολική Ασία	Χρώμα επιδερμίδας από ανοικτό έως λίγο σκούρο. Χαρακτηριστικά χονδροειδή έως πολύ χονδροειδή.	Υπερμελάγχρωση +++ Ερύθημα +++ που γυρίζει προς υπερμελάγχρωση	Καλή

Σημείωση: Ο συσχετισμός μεταξύ της κλίμακας του Fitzpatrick και της γενετικής-φυλετικής ταξινόμησης μπορεί να είναι χρήσιμος για την πρόβλεψη της δερματικής ανταπόκρισης στην χημική απολέπιση.

ΓΕΝΕΤΙΚΑ-ΦΥΛΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ


(Α) ☐ (Β) ☐ (Γ) ☐ (Δ) ☐ (Ε) ☐ (Ζ) ☐



7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Η ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μονάδα δερματος σημαίνει το τμήμα του δέρματος το οποίο πρόκειται να υποστεί απολέπιση. Οι μονάδες δερματος κατηγοριοποιήθηκαν αυθαίρετα με τον ακόλουθο τρόπο:

ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	Μέτωπο
B	ΔΕΞΙ ζυγωματικό (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από τα μάτια, της ρινοπαρειαικής αύλακος και της ρινοχειλικής περιοχής)
Γ	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ζυγωματικό (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από τα μάτια, της ρινοπαρειαικής αύλακος και της ρινοχειλικής περιοχής)
Δ	Λαιμός
E	Ντεκολτέ – Στήρνο
Z	Πλάτη
H	Άλλα μέρη του σώματος



ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ / ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

A □ B □ Γ □ Δ □ E □ Z □ H □

8. ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Αριθμός ατομικών θεραπειών _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

____ Ημ. / ____ μην. / ____ έτος

Ενδιάμεσος χρόνος μεταξύ της πρώτης και της επόμενης θεραπείας ____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2ης ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(αν υπάρχει)

____ Ημ. / ____ μην. / ____ έτος

Προβλεπόμενη διάρκεια για τον πλήρη κύκλο θεραπείας _____

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3ης ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(αν υπάρχει)

____ Ημ. / ____ μην. / ____ έτος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4ης ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
(αν υπάρχει)

____ Ημ. / ____ μην. / ____ έτος

9. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συχνότητα εφαρμογών του βοηθήματος στις διάφορες μονάδες δερματος που πρόκειται να υποστούν απολέπιση (αν είναι περισσότερες από μία)

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ			
	1η θεραπεία	2η θεραπεία	3η θεραπεία	4η θεραπεία
A	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
B	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
Γ	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
Δ	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
E	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
Z	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων
H	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων	προϊόντος παρτίδας min. στρώσεων

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features ten identical rows of horizontal guidelines. Each row is composed of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line, providing a structured space for practicing letter formation and alignment.

[illegible]