




CHEMOEXFOLIATION
ENERPEEL®

CE 0373

КАРТОН НА ПАЦИЕНТА

1. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА

Име и фамилия _____

Адрес _____

Телефон/мобилен _____

Възраст _____ Пол ☐ F ☐ M

2. КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ – КОГА ХИМИЧЕСКОТО ЕКСФОЛИРАНЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЛАГА

- наличие на херпес симплекс в областта на третиране;
- скорошни хирургични интервенции (преди по-малко от 6 месеца), като например блефаропластика, лифтинг на клепачи и др.);
- Заболявания и имunosupресивни терапии, провеждани в момента;
- предишна радиотерапия на част от кожата за екسفолуиране, която може да попречи на физиологичната регенерация на кожата;
- фамилна история с наличие на келоиди и/или хипертрофични белези;
- фамилна история с наличие на постинфламаторна хиперпигментация;
- бременност;
- кърмене;
- алергия и/или известна свръхчувствителност или друга известна и/или предполагаема непоносимост към един или повече компоненти;
- други медицински съображения.

3. ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

При химическата екسفолуация, десквамацията се последва от регенерация на епидермалните клетки, което води до превенция, контрол, лечение или повлияване на различни кожни проблеми. Медицинските изделия ENERPEEL® се прилагат върху кожата с цел превенция, контрол, лечение или повлияване на различни кожни проблеми, като например хипертрофични белези, кожна еластоза, възпалително и комедонно акне, белези от акне и различни актинични увреди, някои от които могат да играят ролята на преанкероза.

3.1.1. кожни увреждания от ултравиолетови лъчи

- Актинична кератоза
- Слънчева еластоза
- Лентиго соларис

- Дерматохелиоза (преждевременно състаряване на кожата)
- Промяна в пигментацията

3.1.2. лезии от хиперпигментация

- мелазма
- постинфламаторна хиперпигментация

3.1.3. акне и други показания

- повърхностни белези
- лъчева кератоза
- акне вулгарис
- белези от акне
- плоски брадавици
- хиперплазия на мастни жлези
- папуло-пустулозна розацея

4. ОЦЕНКА НА ФОТИПА СПОРЕД СКАЛАТА НА FITZPATRICK

Класификация на фототиповете по Fitzpatrick

ФОТОТИП	ОПИСАНИЕ
Фототип I	Хора с много бледа кожа, често с лунички, руса или червена коса, сини или сиви очи. Те обикновено развиват видимо зачервяване към всякакво незащитено излагане на слънце. Тенът е много слаб или липсва. Има крайна реакция към слънчевите лъчи и висок риск от перманентни увреждания.
Фототип II	Хора с бледа кожа, тъмно руса или бледо кестенява коса. Изгарят лесно на слънцето. Придобиват лек (златист) тен.
Фототип III	Хора с относително тъмна кожа, кестенява коса. Те изгарят на слънцето само след продължително излагане. Придобиват дълбок, равномерен тен.
Фототип IV	Хора с мургав цвят на кожата, тъмни очи и черна коса. Те изгарят рядко от слънцето. Бързо придобиват дълбок, шоколадов тен.
Фототип V	Хора с много тъмен цвят на кожата, тъмни очи и черна коса. Те изгарят много рядко на слънце.
Фототип VI	Хора с черен цвят на кожата, тъмни очи и черна коса.

*** Важни предупреждения:** Фототиповете IV, V и VI по скалата на Fitzpatrick може да са изложени на по-голям риск от хиперпигментация на третираните зони. Фототиповете I, II и III могат да развият по-лесно еритема и цикатрикси (белези).

ФОТОТИП НА ПАЦИЕНТА

I ☐ II ☐ III ☐ IV ☐ V ☐ VI ☐

КАРТОН НА ПАЦИЕНТА

5. ОЦЕНКА НА ФОТО-ОСТАРЯВАНЕТО СПОРЕД КЛАСИФИКАЦИЯТА НА GLOGAU

Класификация според скалата на GLOGAU

СТЕПЕН	ВЪЗРАСТ	ОПИСАНИЕ
Слабо	от 28 до 35 год.	Характеризира се с малко бръчки, без кератоza
Умерено	от 35 до 50 год.	Характеризира се с малко бръчки, жълтеникав цвят на кожата с наличие на актинична кератоza
Напреднало	от 50 до 65 год.	Характеризира се с дълбоки бръчки, наличие на телеангиectаза, пигментни лезии и актинична кератоza
Силно	от 60 до 75 год.	Характеризира се с динамични и гравитационни бръчки, фото-състаряване и актинична кератоza

ФОТО-ОСТАРЯВАНЕ

СЛАБО ☐ УМЕРЕНО ☐ НАПРЕДНАЛО ☐ СИЛНО ☐

6. ГЕНЕТИЧНО-РАСОВА КЛАСИФИКАЦИЯ И СЪОТВЕТНИ РЕАКЦИИ КЪМ ХИМИЧЕСКО ЕКСФОЛИРАНЕ

Различните реакции на кожата при хора от различен расов произход към химическото екcфолиране (химически пилинг) може да се разделят на 6 категории. При всяка категория цветът на кожата е свързан със соматичните характеристики. Тези категории се базират на географско разпределение и са описани в долната таблица:

РАСА	ОРИГИНАЛЕН ГЕОГРАФСКИ ХАБИТАТ	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОЖАТА И ЧЕРТИ	УСЛОЖНЕНИЯ И СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ	РЕЙТИНГ НА КАНДИДАТА
(А) Северна (шведи, ирландци и др.)	Северна Европа	Светъл до много светъл цвят. Много фина кожа и черти.	Зачервяване +++ Телеангиectазия Поява на белези	Много добър
(Б) Европейска (французи, италианци, англичани, германци и др.)	Централна и Южна Европа	Нормален цвят, груба кожа и черти.	Ниска вероятност	Отлична
(В) Средиземноморска (испанци, гърци и др.)	Северна Африка и Западна Азия	По-тъмни и по-груби от европейската.	Хиперпигментация + до ++ Зачервяване +	Много добър
(Г) Инд-пакистанска (пакистанци, тайландци и др.)	Северна Централна Африка и Южна Западна Азия	По-груби и по-тъмни от средиземноморската с плътна кожа и коса с тенденция към омазняване.	Хиперпигментация +++ Хипопигментация +	Допустим за пилинг
(Д) Африканска (афро-американци, суданци и др.)	Средна и Южна Африка	Черен до много черен цвят. Черти и кожа – груби до много груби.	Хипопигментация + Хиперпигментация ++	Допустим за пилинг
(Е) Азиатска (японци, корейци и др.)	Източна Азия	Отделна класификация за цвят – от светъл до средно тъмен. Кожа и черти – груби до много груби.	Хиперпигментация +++ Зачервяване +++ преминаващо в Хиперпигментация	Добър

Забележка: Връзката между скалата на Fitzpatrick и расово-генетичната класификация може да е полезна за предвиждане на реакцията на кожата към химически пилинг, както по отношение на оценката на ефективността, така и по отношение на възможните странични ефекти.

ГЕНЕТИЧНО-РАСОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЦИЕНТА

(А) ☐ (Б) ☐ (В) ☐ (Г) ☐ (Д) ☐ (Е) ☐




КАРТОН НА ПАЦИЕНТА

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОЖЕН УЧАСТЪК, КОЙТО ЩЕ СЕ ТРЕТИРА

Кожен участък е онази част от кожата, която ще бъде подложена на ексфолиране. Кожните участъци се класифицират условно, както следва:

КОЖЕН УЧАСТЪК	ОПИСАНИЕ
А	Чело
Б	Дясна зигоматична зона (включително околоочната област, назалната бразда и назолабиалната зона)
В	Лява зигоматична зона (включително околоочната област, назалната бразда и назолабиалната зона)
Г	Шия
Д	Деколте
Е	Гръб
Ж	Различни други части тялото



КОЖЕН УЧАСТЪК / УЧАСТЪЦИ ЗА ТЕРАПИЯ

А □ Б □ В □ Г □ Д □ Е □ Ж □

8. ЦИКЪЛ ПРЕДВИЖДАНИ ТЕРАПИИ

Брой отделни третириания _____	дата за провеждане на 1 терапия _____	ден / месец / година
Време между две последователни третириания _____	дата за провеждане на 2 терапия (ако има) _____	ден / месец / година
Предвиждана продължителност на целия терапевтичен курс _____	дата за провеждане на 3 терапия (ако е планирана) _____	ден / месец / година
_____	дата за провеждане на 4 терапия (ако е планирана) _____	ден / месец / година

9. ИЗПОЛЗВАНИ МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Последователност на приложение на средствата за различните кожни участъци за третиране (ако са повече от един)

ТРЕТИРАНА КОЖНА ЗОНА	ВРЕМЕ ЗА НАНАСЯНЕ И ПАРТИДА НА ИЗПОЛЗВАНИЯ ПРОДУКТ ПРЕДИ НЕУТРАЛИЗИРАНЕТО И/ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕТО НА УТАЙКАТА - ТЕРАПИИ			
	1° терапия	2° терапия	3° терапия	4° терапия
А	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
Б	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
В	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
Г	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
Д	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
Е	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете
Ж	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете	продукт batch мин. слоевете

[illegible][illegible]