IT

#### MANUALE DI ISTRUZIONI



# ROSAGATE® PROFESSIONAL KIT

FOR SENSITIVE AND INTOLERANT SKIN PRONE TO COUPEROSE



**PROFESSIONAL SPECIALTIES** 









### ROSAGATE<sup>®</sup> PROFESSIONAL KIT

**ROSAGATE® Professional** è un protocollo dermo-funzionale ad uso professionale sviluppato per modificare l'aspetto e mantenere in buono stato la cute caratterizzata da couperose.

La sua specifica azione contrasta in modo efficace il rossore intermittente o permanente che sia diffuso o localizzato anche quando caratterizzato da elevata intensità, contrastando la visibilità dei piccoli vasi superficiali, particolarmente evidenti nella porzione zigomatica del viso.

**ROSAGATE® Professional**, grazie alla spiccata proprietà lenitiva, è in grado di diminuire la percezione di fastidiose sensazioni, quali pizzicore e bruciore, che normalmente descrivono anche il quadro delle pelli sensibili, intolleranti ed iper-reattive.

La sua particolare azione è diretta ad aumentare la soglia di tollerabilità della cute.

#### 1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI DEL KIT

Il kit di ROSAGATE® Professional contiene:

- PS-R Preparatory Solution: bustine contenenti le salviette imbevute di soluzione detergente da utilizzarsi per rimuovere eventuali accumuli di sebo e rendere quindi più omogenea la stesura dell'emulsione funzionale sulla cute (scatola N°1).
- ROSAGATE® Functional emulsion (di seguito anche denominata emulsione funzionale): sistema bifasico fluido contenuto all'interno delle ampolle richiudibili (scatola N°2). Sulle ampolle è impressa una scala graduata che permette di visualizzare la quantità di emulsione funzionale applicata.
- APPLICATORE: pennellino monouso da alloggiare sulla testa dell'ampolla (scatola N°3). Il sistema composto dall'applicatore a pennello montato sull' ampolla è definito VIALBRUSH.
- TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask: maschera funzionale contenuta in pratiche bustine monodose da 2,5 ml da utilizzarsi a fine procedura (scatola N°4).

#### 2. COME UTILIZZARE LE AMPOLLE

#### ROSAGATE® Functional emulsion

- Staccare un'ampolla da quelle adiacenti: le ampolle sono saldate tra loro a livello del corpo e della testa (capsula di chiusura).
- 2. Esercitare la forza necessaria al distacco dell'ampolla da utilizzare da quelle adiacenti evitando di provocare l'involontaria rimozione della capsula di chiusura;
- 3. Rimuovere la capsula di chiusura tenendo l'ampolla in posizione verticale (con l'apertura rivolta verso l'alto):

- con una mano impugnare il corpo dell'ampolla, e con l'altra rimuovere la capsula di chiusura con movimento rotatorio evitando che la pressione esercitata sul corpo dell'ampolla determini la fuoriuscita del contenuto (a tale riguardo si consiglia di impugnare il corpo dell'ampolla nella parte prossimale al foro di uscita);
- Dopo aver rimosso la capsula di chiusura, qualora non fosse immediatamente inserito l'applicatore a pennello, richiudere l'ampolla con la capsula di chiusura precedentemente rimossa;
- Inserire l'applicatore a pennello: prelevare dal piano di lavoro l'applicatore a pennello e alloggiarlo, esercitando la necessaria pressione sulla testa dell'ampolla, assicurandosi che rimanga ad essa ben fissato;
- 6. Dopo aver inserito l'applicatore a pennello alloggiare la capsula di chiusura su un ripiano nelle vicinanze in modo di poter facilmente utilizzare la medesima per richiudere l'ampolla.

### 3. COME EFFETTUARE LA PROCEDURA DERMO-FUNZIONALE

La procedura dermo-funzionale consiste di 3 fasi:

- preparazione della pelle all'utilizzo di ROSAGATE® Functional emulsion utilizzando le salviette PS-R Preparatory Solution;
- 2. applicazione dell'emulsione funzionale ROSAGATE®;
- terminare la procedura attraverso l'applicazione della maschera funzionale TEBISKIN® ROSAGATE-MASK Leave-on Hidden Gel-Mask.

#### 3.1. Descrizione della procedura

- Accomodare il paziente sul lettino in posizione supina con lo schienale del lettino inclinato di 15° per evitare che l'emulsione funzionale possa involontariamente colare verso il basso e, ad esempio, arrivare a contatto con gli occhi o il vermiglio;
- procedere alla protezione degli occhi con materiale idoneo come compresse di garza oculari, eventualmente imbevute di soluzione fisiologica;
- estrarre la salvietta di PS-R Preparatory Solution ed utilizzarla per la delipidificazione delle aree cutanee da trattare esercitando un leggero sfregamento;
- rimuovere la capsula di chiusura e alloggiare sulla testa dell'ampolla l'applicatore a pennello esercitando la pressione necessaria al fine di un ancoraggio sicuro dell'applicatore sulla testa dell'ampolla;
- al fine di un corretto utilizzo dell'ampolla VIALBRUSH® e per verificare l'omogeneità del flusso di uscita del prodotto, prima di iniziare la procedura dermo-funzionale è consigliabile effettuare un'erogazione di prova





# ROSAGATE<sup>®</sup> PROFESSIONAL KIT

sul dorso della mano dell'operatore, indossando un guanto protettivo imbibendo di soluzione l'applicatore a pennello;

- 6. applicare l'emulsione funzionale sulle aree cutanee da trattare esercitando una leggera pressione sull'ampolla in modo da permettere la fuoriuscita dell'emulsione funzionale. Stendere l'emulsione funzionale in modo omogeneo su tutta l'area cutanea interessata. Lasciare agire per 10-15 minuti;
- al termine della procedura rimuovere l'applicatore a pennello dalla testa dell'ampolla e sigillarla utilizzando la capsula di chiusura (gettare l'applicatore a pennello in luogo sicuro, in contenitori idonei per lo smaltimento);
- 8. trascorso il tempo di posa, applicare il contenuto di una bustina **TEBISKIN® ROSAGATE-MASK** Leave-on Hidden Gel-Mask (2,5 ml) massaggiando delicatamente per ottenere una omogenea distribuzione del prodotto sulla cute.
- al termine della procedura dermo-funzionale, smaltire il materiale utilizzato seguendo le specifiche normative Europee, Nazionali e Locali in materia di protezione dell'ambiente.

#### 3.2. Modalità e frequenza di utilizzo

Quantità di **ROSAGATE®** *Functional emulsion* da utilizzare per singola procedura dermo-funzionale:

Si consiglia di utilizzare 1 - 2 ml di *emulsione funzionale* in funzione della superficie cutanea interessata.

Qualora la soluzione contenuta nelle ampolle non fosse totalmente utilizzata, richiudere saldamente le ampolle con la capsula di chiusura. Le ampolle possono essere utilizzate entro un periodo di 90 giorni dalla data di prima apertura.

### 3.3. Pianificazione della procedura dermo-funzionale con ROSAGATE® Professional

I benefici ottenibili risultano statisticamente significativi già dopo due procedure dermo-funzionali da effettuarsi a distanza di circa 5-10 giorni l'una dall'altra. Ulteriori procedure, mantenendo sempre un intervallo di 5-10 giorni, potranno essere effettuate in funzione del risultato ricercato e della severità delle condizioni della cute del soggetto.

#### 4. PRECAUZIONI GENERALI DI UTILIZZO

- Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto, protetto dalla luce e lontano da fonti di calore.
- Conservare il prodotto e ogni accessorio contenuto nel kit in luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Dopo aver utilizzato l'emulsione funzionale ROSAGA-TE®, al termine di ogni procedura, rimuovere l'applicatore e richiudere con la capsula di chiusura (anche se il contenuto dell'ampolla fosse stato completamente

utilizzato).

- Dopo l'utilizzo rialloggiare ogni componente del kit all'interno delle confezioni originali.
- Durante la procedura dermo-funzionale indossare sempre appropriate protezioni (camice, guanti, mascherina, ecc).
- Smaltire gli accessori utilizzati e non più riutilizzabili seguendo le specifiche normative nazionali e locali in materia di protezione ambientale e smaltimento dei rifiuti.

#### 4.1. Criteri di esclusione:

- Intolleranza nota o prevedibile ad uno o più ingredienti dei prodotti.
- Gravidanza (In tal caso il prodotto potrebbe essere utilizzato, qualora il medico lo ritenesse necessario, a partire dal quarto mese di gravidanza).





#### General Topics s.r.l.

25087 Salò (BS) - ITALIA
Tel. +39 0365 529117 • Fax +39 0365 522619
web: www.tebitech.com • e-mail: info@tebitech.com
www.general-topics.com